

Examenseries

Diploma Eerste Hulp



© 2021

Inhoud

Examenseries Diploma Eerste Hulp	3
Uitleg - aanwijzingen	5
Algemeen	5
Het examen	5
Reanimatie	6
Levensbedreigend bloedverlies	6
Examenteam	6
Examenscenario's	6
De series	7
Serie A	7
Serie B	9
Serie C	11
Serie D	13
Serie E	15
Serie F	17

Examenseries Diploma Eerste Hulp

De examens voor het Diploma Eerste Hulp worden volgens de laatste richtlijnen afgenomen. De onderdelen waarin examen gedaan wordt, liggen vast. De volgorde waarin de onderdelen geëxamineerd worden, wordt in overleg tussen examinatoren en lotusslachtoffers bepaald. Omdat er per kandidaat een half uur geëxamineerd wordt, is het zaak dat de onderwerpen goed verdeeld worden over de beide examinatoren en de lotusslachtoffers. Hiervoor dienen zowel de beide examinatoren als de lotusslachtoffers minimaal *een half uur* voor aanvang van het examen aanwezig te zijn. In deze tijd kan men overleggen om tot een goede verdeling van de onderwerpen komen.

Het is noodzakelijk dat er bij ieder examen *twee* lotusslachtoffers aanwezig zijn. Iedere examiner heeft dus zijn 'eigen' lotusslachtoffer.

De examenseries zijn zo opgebouwd, dat het voor de lotusslachtoffers mogelijk is meerdere wonden te grimeren. Zo kan men bijvoorbeeld een wond aan een hand grimeren en een wond aan het been. De wond aan het been kan men dan bedekt houden totdat deze nodig is. Alle wonden worden gegrimeerd. Voor shock, hersenvliesontsteking en kinderziekten geldt een uitzondering. Shock en hersenvliesontsteking mogen worden uitgevraagd of zonder grime worden gespeeld.

Het handelen bij kinderziekten wordt op het examen door middel van enkele van de volgende vragen geëxamineerd:

- Moet een kind met een kinderziekte thuis blijven? Waarom wel/niet?
- Wanneer moet u bij ziekte van een kind de huisarts of huisartsenpost bellen?
- Wanneer adviseert een eerstehulpverlener de huisarts te bellen?
- Wanneer adviseert een eerstehulpverlener een zwangere de huisarts of huisartsenpost te bellen?
- Wat doe je als een kind:
 - o een erg zieke indruk maakt of steeds zieker wordt en je het niet vertrouwt
 - o erg benauwd is, heel snel of anders ademt
 - o suf wordt of gaat kreunen
 - o de mond bijna niet open kan krijgen
 - o niet kan drinken of slikken
 - o opvallend kwijlt
- Wat adviseert de eerstehulpverlener bij:
 - o lusteloosheid, bleekheid, dikke oogleden en roze urine
 - o dikke, rode gewrichten en koorts
 - o onrustige bewegingen

Een van de onderdelen van alle series is het zwachtelen bij hevig bloedverlies. Dit gebeurt zo strak mogelijk. Het lotusslachtoffer is degene die bepaalt hoe strak dat is.

Om dit voor een lotusslachtoffer zo min mogelijk belastend te laten zijn kunnen de volgende maatregelen genomen worden:

- Het lotusslachtoffer kan de verwonding zowel links als rechts grimeren, zodat hij om en om belast wordt.
- De series en de onderdelen daarbinnen kunnen zo over de combinaties van examiner/lotusslachtoffer worden verdeeld dat het hevige bloedverlies per 4 kandidaten afwisselend door het ene en het andere lotusslachtoffer wordt uitgebeeld.
- Als het echt te erg wordt, kan het lotusslachtoffer de handeling onderbreken door 'no-play' aan te geven.

In de examens kan een onderdeel zijn het aanleggen van een tourniquet of het opstoppen van een wond. Hierbij grimeert de lotus het letsel zo goed als mogelijk. Het is vaak (om praktische redenen)

niet mogelijk dat het bloed echt uit de wond spuit. De examiner dient dit duidelijk aan te geven aan de kandidaat.

De kandidaat kiest bij dit soort bloedingen voor het aanleggen van een tourniquet of het opstoppen van de wond. Bij het aanleggen van het tourniquet, doet de kandidaat dit om zijn of haar eigen bovenbeen of op een door de organisatie beschikbaar gestelde fantoom, ook als het lotusslachtoffer de verwonding op zijn onderarm gegrimeerd heeft. Het gaat er om dat hij de techniek van het aanleggen beheerst.

Voor het opstoppen heeft de organisatie een opstopmodel klaar staan, met voldoende opstopmateriaal voor iedere kandidaat.

Indien de kandidaat kiest voor het opstoppen van een wond terwijl er een tourniquet aangelegd kan worden, is dit *niet* competent, zelfs niet als het opstoppen correct gedaan wordt. Dit geldt ook voor het aanleggen van een tourniquet als er eigenlijk opgestopt dient te worden.

Uitleg - aanwijzingen

Algemeen

Een examen wordt afgenomen wanneer er minimaal 5 en maximaal 12 kandidaten zijn. De examinatoren ontvangen bij de bevestiging van het examen meteen de series die tijdens dit examen afgenomen moeten worden. Voor iedere 4 kandidaten wordt 1 serie gebruikt.

Dus:

tot en met 8 kandidaten = 2 series

tot en met 12 kandidaten = 3 series gebruiken.

De examinatoren ontvangen altijd 3 series. Als er 8 of minder kandidaten zijn, kan de examiner bepalen welke 2 van de 3 series er afgenomen worden. Het is niet toegestaan onderdelen uit de verschillende series door elkaar te gebruiken.

In welke volgorde de series afgenomen worden (bijvoorbeeld eerst serie A1 en daarna serie B2, of andersom) bepalen de examinatoren zelf.

De onderdelen in de series staan vast. Dit zijn verplichte onderdelen. Het is nadrukkelijk niet toegestaan andere onderdelen toe te voegen aan de serie. De volgorde waarin men de diverse onderdelen afneemt, bepalen de examinatoren in overleg met de Lotusslachtoffers.

Alle kandidaten maken (ongeacht de behaalde resultaten) het hele examen af.

Het examen

Het examen bestaat uit 3 delen:

- Deel 1: onderdelen die gedurende het gehele examen geëxamineerd worden: Let op gevaar en Zorg voor professionele hulp. De kandidaat moet hier gedurende het gehele examen oog voor hebben. Dit betekent dus ook dat dit deel door beide examinatoren beoordeeld wordt. Bij een niet gelijk oordeel komen de examinatoren tot een consensus
- Deel 2: levensbedreigende ziekten en letsels. Een aantal onderdelen van dit deel zijn niet per serie standaard opgenomen. Dit houdt in dat niet alle vakjes in deel 2 ingevuld worden met een oordeel. De onderdelen die wel standaard opgenomen zijn in dit deel zijn:

- o Stabiele zijligging
- o Reanimatie volwassenen (gehele protocol: benaderen, aanschudden, 112 bellen + AED halen, van buik naar rug draaien, ademhaling controleren, reanimatie)
- o Reanimatie baby (alleen reanimatie)
- o Levensbedreigend/actief bloedverlies

De overige levensbedreigende letsels variëren per serie.

- Deel 3: Overige letsels. Hier zijn 5 onderdelen per examenserie opgenomen. Per onderdeel kan men maximaal 2 punten halen. Hoeveel punten men kan halen per letsel, staat aangegeven in de series. Als een letsel met 2 punten beoordeeld kan worden, kan men hier alleen 2 of (bij niet competent) 0 punten voor halen.

De kandidaat kan maximaal 7 punten behalen in deel 3. Bij minimaal 5 punten wordt de kandidaat voor dit deel competent verklaard.

Bij alle letsels moet de examiner kunnen constateren of de kandidaat het bewustzijn en de ademhaling beoordeeld heeft.

Indien 112 gebeld wordt, moet de kandidaat aangeven dat de telefoon op luidspreker is gezet.

Cesuur¹

Onderwerpen uit de gedeelten 'Gedurende het gehele examen' en 'Levensbedreigende letsels en ziekten' moeten effectief uitgevoerd worden. Als dat niet het geval is, is een kandidaat niet

¹ De **cesuur** is de zak/slaaggrens bij de beoordeling van een toets/examen.

competent. De kandidaat moet het examen wel afmaken. Voor de onderwerpen uit het gedeelte 'Overige letsels' kan men maximaal 7 punten halen. Hiervan moet de kandidaat minimaal 5 punten hebben om competent te zijn. Het aantal te behalen punten per onderwerp staat tussen haakjes achter de verwonding aangegeven.

Bij deze puntentelling geldt het principe 'alles of niets'. Dit houdt in dat als een kandidaat voor een onderdeel 2 punten kan krijgen en hij de handeling voor een deel wel goed, maar voor een deel niet goed uitvoert, hij toch 0 punten krijgt. De kandidaat heeft tenslotte de totale handeling niet goed uitgevoerd. Als hij de overige handelingen wel goed uitvoert, komt hij toch nog aan 5 punten en is hij alsnog competent. Handelingen horen conform de richtlijnen uitgevoerd te worden, waarbij de effectiviteit van het handelen voorop staat.

Reanimatie

In het examen zijn twee reanimaties opgenomen: de reanimatie van een volwassene en de reanimatie van een zuigeling (tot 1 jaar).

Bij de reanimatie van de volwassene moet de kandidaat het gehele protocol volgen.

Bij de reanimatie van de zuigeling hoeft de kandidaat alleen de daadwerkelijke reanimatie te laten zien; het aanschudden, bellen van 112 etc. heeft de kandidaat immers al eerder laten zien of wordt nog uitgevraagd bij de reanimatie van een volwassene.

Levensbedreigend bloedverlies

In het examen wordt gesproken over levensbedreigend bloedverlies aan arm of been. Afhankelijk van de andere letsels is het aan het lotusslachtoffer op welke plek hij dit wil grimeren. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de mogelijkheid om de tourniquet op 5-8cm boven de bloedende wond aan te kunnen leggen, zonder dat dit over een gewricht gedaan wordt.

Examenteam

Het examenteam bestaat uit twee onafhankelijke examinatoren. Beiden zijn in het bezit van het diploma Instructeur Eerste Hulp en in ieder geval één van de examinatoren is in het bezit van het certificaat instructeur PBLS/AED van de NRR.

Examenscenario's

Er zijn twee examenscenario's denkbaar.

1. Beide reanimaties worden door 1 examinator afgenomen. Het heeft in dit geval de voorkeur om te starten met de reanimatie van de volwassene, waarbij het gehele protocol doorlopen wordt. Na afloop van deze reanimatie wordt gevraagd om de reanimatie op een zuigeling te laten zien.
2. Indien beide examinatoren in het bezit zijn van het instructeurschap (P)BLS/AED van de NRR, kan er voor gekozen worden om de reanimatie te verdelen over de beide examinatoren. Ook hier geldt dat bij de reanimatie van de volwassene het gehele protocol doorlopen dient te worden. Bij de reanimatie van de zuigeling kan volstaan worden met alleen het laten zien van de reanimatie. Overigens mag alleen de examinator in het bezit van het instructeurschap PBLS/AED van de NRR de reanimatie van de zuigeling beoordelen.

De series

Serie A

A1

Gedurende het gehele examen

Let op gevaar – Inschakelen zorgprofessional

Levensbedreigende letsels en ziekten

Stabiele zijligging – Reanimatie volwassene (gehele protocol) – Reanimatie zuigeling – Actief bloedverlies onderarm – Wervelletsel – Rautekgreep – Inademing rook, gas of chemische stof - Shock

Overige letsels

Kleine snijwond (1) – Vuiltje in het oog (1) – Onderkoeling (1) – Gedeeltelijke verbranding huid (2) – Wond aan hand (zwachtelen) (2)

A2

Gedurende het gehele examen

Let op gevaar – Inschakelen zorgprofessional

Levensbedreigende letsels en ziekten

Stabiele zijligging – Reanimatie volwassene (gehele protocol) – Reanimatie zuigeling – Actief bloedverlies onderarm – Wervelletsel – Rautekgreep – Inademing rook, gas of chemische stof - Shock

Overige letsels

Schaafwond (1) – Bloedneus (1) – Buikpijn/menstruatiepijn (1) – Verstuiking enkel (2) – Overerhitting (2)

A3

Gedurende het gehele examen

Let op gevaar – Inschakelen zorgprofessional

Levensbedreigende letsels en ziekten

Stabiele zijligging – Reanimatie volwassene (gehele protocol) – Reanimatie zuigeling – Actief bloedverlies onderarm – Wervelletsel – Rautekgreep – Inademing rook, gas of chemische stof - Shock

Overige letsels

Open blaar (1) – Tand door lip (1) – Spierkramp (1) – Open botbreuk onderbeen (2) – Flauwte zonder wegraking (2)

A4

Gedurende het gehele examen

Let op gevaar – Inschakelen zorgprofessional

Levensbedreigende letsels en ziekten

Stabiele zijligging – Reanimatie volwassene (gehele protocol) – Reanimatie zuigeling – Actief bloedverlies onderarm – Wervelletsel – Rautekgreep – Inademing rook, gas of chemische stof - Shock

Overige letsels

Reiszieke (1) – Eikenprocessierups (1) – Kinderziekten (1) – Verstuiking enkel (2) – Wrijvingsblaar (dicht) (2)

A5

Gedurende het gehele examen

Let op gevaar – Zorg voor professionele hulp

Levensbedreigende letsels en ziekten

Stabiele zijligging – Reanimatie volwassene (gehele protocol) – Reanimatie zuigeling – Actief bloedverlies onderarm – Wervelletsel – Rautekgreep – Inademing rook, gas of chemische stof - Shock

Overige letsels

Splinterwond (1) – Spierletsel (1) – Bloedneus (1) – Gedeeltelijke verbranding huid (2) – Open botbreuk onderbeen (2)

Serie B

B1

Gedurende het gehele examen

Let op gevaar – Inschakelen zorgprofessional

Levensbedreigende letsels en ziekten

Stabiele zijligging – Reanimatie volwassene (gehele protocol) – Reanimatie zuigeling – Actief bloedverlies kuit – Snel op de zij draaien bij braken – Rautekgreep vanaf een stoel – Borstletsel (borstwond) – Hartklachten

Overige letsels

Oppervlakkige verbranding huid (1) – Tekenbeet (1) – Ontwrichting schouder (1) – Bijtende stof in oog (2) – Flauwte zonder wegraking (2)

B2

Gedurende het gehele examen

Let op gevaar – Inschakelen zorgprofessional

Levensbedreigende letsels en ziekten

Stabiele zijligging – Reanimatie volwassene (gehele protocol) – Reanimatie zuigeling – Actief bloedverlies kuit – Snel op de zij draaien bij braken – Rautekgreep vanaf een stoel – Borstletsel (borstwond) – Hartklachten

Overige letsels

Onderkoeling (1) – Zeedierensteek (1) – Rugpijn (1) – Volledige verbranding huid (2) – Open botbreuk onderarm (2)

B3

Gedurende het gehele examen

Let op gevaar – Inschakelen zorgprofessional

Levensbedreigende letsels en ziekten

Stabiele zijligging – Reanimatie volwassene (gehele protocol) – Reanimatie zuigeling – Actief bloedverlies kuit – Snel op de zij draaien bij braken – Rautekgreep vanaf een stoel – Borstletsel (borstwond) – Hartklachten

Overige letsels

Kleine snijwond (1) – Oorpijn (1) – Ontwrichting schouder (1) – Vergiftiging via de huid (2) – Oververhitting (2)

B4

Gedurende het gehele examen

Let op gevaar – Inschakelen zorgprofessional

Levensbedreigende letsels en ziekten

Stabiele zijligging – Reanimatie volwassene (gehele protocol) – Reanimatie zuigeling – Actief bloedverlies kuit – Snel op de zij draaien bij braken – Rautekgreep vanaf een stoel – Borstletsel (borstwond) – Hartklachten

Overige letsels

Schaafwond (1) – Voorwerp in neus (1) – Insectenbeet/-steekr (1) – Verstuiking enkel (2) – Chemische brandwond (2)

B5**Gedurende het gehele examen**

Let op gevaar – Inschakelen zorgprofessional

Levensbedreigende letsels en ziekten

Stabiele zijligging – Reanimatie volwassene (gehele protocol) – Reanimatie zuigeling – Actief bloedverlies kuit – Snel op de zij draaien bij braken – Rautekgreep vanaf een stoel – Borstletsel (borstwond) – Hartklachten

Overige letsels

Open blaar (1) – Onderkoeling (1) – Vuiltje in het oog (1) – Gedeeltelijke verbranding huid (2) – Snijwond pols (zwachtelen) (2)

Serie C

C1

Gedurende het gehele examen

Let op gevaar – Inschakelen zorgprofessional

Levensbedreigende letsels en ziekten

Stabiele zijligging – Reanimatie volwassene (gehele protocol) – Reanimatie zuigeling – Aanleggen tourniquet levensbedreigende bloeding arm/been – Snel op de zij draaien bij braken – Wervelletsel – Shock – Klachten enige tijd na ongeluk

Overige letsels

Kleine snijwond (1) – Vuiltje in het oog (1) – Onderkoeling (1) – Gedeeltelijke verbranding huid (2) – Wond aan hand (zwachtelen) (2)

C2

Gedurende het gehele examen

Let op gevaar – Inschakelen zorgprofessional

Levensbedreigende letsels en ziekten

Stabiele zijligging – Reanimatie volwassene (gehele protocol) – Reanimatie zuigeling – Aanleggen tourniquet levensbedreigende bloeding arm/been – Snel op de zij draaien bij braken – Wervelletsel – Shock – Klachten enige tijd na ongeluk

Overige letsels

Schaafwond (1) – Bloedneus (1) – Buikpijn/menstruatiepijn (1) – Verstuiking enkel (2) – Oververhitting (2)

C3

Gedurende het gehele examen

Let op gevaar – Inschakelen zorgprofessional

Levensbedreigende letsels en ziekten

Stabiele zijligging – Reanimatie volwassene (gehele protocol) – Reanimatie zuigeling – Aanleggen tourniquet levensbedreigende bloeding arm/been – Snel op de zij draaien bij braken – Wervelletsel – Shock – Klachten enige tijd na ongeluk

Overige letsels

Open blaar (1) – Tand door lip (1) – Spierkramp (1) – Open botbreuk onderbeen (2) – Flauwte zonder wegraking (2)

C4

Gedurende het gehele examen

Let op gevaar – Inschakelen zorgprofessional

Levensbedreigende letsels en ziekten

Stabiele zijligging – Reanimatie volwassene (gehele protocol) – Reanimatie zuigeling – Aanleggen tourniquet levensbedreigende bloeding arm/been – Snel op de zij draaien bij braken – Wervelletsel – Shock – Klachten enige tijd na ongeluk

Overige letsels

Reiszieke (1) – Eikenprocessierups (1) – Kinderziekten (1) – Verstuiking enkel (2) – Wrijvingsblaar (dicht) (2)

C5

Gedurende het gehele examen

Let op gevaar – Inschakelen zorgprofessional

Levensbedreigende letsels en ziekten

Stabiele zijligging – Reanimatie volwassene (gehele protocol) – Reanimatie zuigeling – Aanleggen tourniquet levensbedreigende bloeding arm/been – Snel op de zij draaien bij braken – Wervelletsel – Shock – Klachten enige tijd na ongeluk

Overige letsels

Splinterwond (1) – Spierletsel (1) – Bloedneus (1) – Gedeeltelijke verbranding huid (2) – Open botbreuk onderbeen (2)

Serie D

D1

Gedurende het gehele examen

Let op gevaar – Inschakelen zorgprofessional

Levensbedreigende letsels en ziekten

Stabiele zijligging – Reanimatie volwassene (gehele protocol) – Reanimatie zuigeling – Opstoppen wond in verband met slagaderlijke bloeding oksel – Snel op de zij draaien bij braken – Rautekgreep – Hartklachten – Hitteberoerte

Overige letsels

Oppervlakkige verbranding huid (1) – Tekenbeet (1) – Ontwrichting schouder (1) – Bijtende stof in oog (2) – Flauwte zonder wegraking (2)

D2

Gedurende het gehele examen

Let op gevaar – Inschakelen zorgprofessional

Levensbedreigende letsels en ziekten

Stabiele zijligging – Reanimatie volwassene (gehele protocol) – Reanimatie zuigeling – Opstoppen wond in verband met slagaderlijke bloeding oksel – Snel op de zij draaien bij braken – Rautekgreep – Hartklachten – Hitteberoerte

Overige letsels

Onderkoeling (1) – Zeedierensteek (1) – Rugpijn (1) – Volledige verbranding huid (2) – Open botbreuk onderarm (2)

D3

Gedurende het gehele examen

Let op gevaar – Inschakelen zorgprofessional

Levensbedreigende letsels en ziekten

Stabiele zijligging – Reanimatie volwassene (gehele protocol) – Reanimatie zuigeling – Opstoppen wond in verband met slagaderlijke bloeding oksel – Snel op de zij draaien bij braken – Rautekgreep – Hartklachten – Hitteberoerte

Overige letsels

Kleine snijwond (1) – Oorpijn (1) – Ontwrichting schouder (1) – Vergiftiging via de huid (2) – Oververhitting (2)

D4

Gedurende het gehele examen

Let op gevaar – Inschakelen zorgprofessional

Levensbedreigende letsels en ziekten

Stabiele zijligging – Reanimatie volwassene (gehele protocol) – Reanimatie zuigeling – Opstoppen wond in verband met slagaderlijke bloeding oksel – Snel op de zij draaien bij braken – Rautekgreep – Hartklachten – Hitteberoerte

Overige letsels

Schaafwond (1) – Voorwerp in neus (1) – Insectenbeet/-steekr (1) – Verstuiking enkel (2) – Chemische brandwond (2)

D5**Gedurende het gehele examen**

Let op gevaar – Inschakelen zorgprofessional

Levensbedreigende letsels en ziekten

Stabiele zijligging – Reanimatie volwassene (gehele protocol) – Reanimatie zuigeling – Opstoppen wond in verband met slagaderlijke bloeding oksel – Snel op de zij draaien bij braken – Rautekgreep – Hartklachten – Hitteberoerte

Overige letsels

Open blaar (1) – Onderkoeling (1) – Vuiltje in het oog (1) – Gedeeltelijke verbranding huid (2) – Snijwond pols (zwachtelen) (2)

Serie E

E1

Gedurende het gehele examen

Let op gevaar – Inschakelen zorgprofessional

Levensbedreigende letsels en ziekten

Stabiele zijligging – Reanimatie volwassene (gehele protocol) – Reanimatie zuigeling – Aanleggen tourniquet levensbedreigend bloedverlies arm/been – Wervelletsel – Snel op de zij draaien bij braken – Verslikking zwangere/persoon met obesitas – Ernstige onderkoeling

Overige letsels

Kleine snijwond (1) – Vuiltje in het oog (1) – Onderkoeling (1) – Gedeeltelijke verbranding huid (2) – Wond aan hand (zwachtelen) (2)

E2

Gedurende het gehele examen

Let op gevaar – Inschakelen zorgprofessional

Levensbedreigende letsels en ziekten

Stabiele zijligging – Reanimatie volwassene (gehele protocol) – Reanimatie zuigeling – Aanleggen tourniquet levensbedreigend bloedverlies arm/been – Wervelletsel – Snel op de zij draaien bij braken – Verslikking zwangere/persoon met obesitas – Ernstige onderkoeling

Overige letsels

Schaafwond (1) – Bloedneus (1) – Buikpijn/menstruatiepijn (1) – Verstuiking enkel (2) – Overerhitting (2)

E3

Gedurende het gehele examen

Let op gevaar – Inschakelen zorgprofessional

Levensbedreigende letsels en ziekten

Stabiele zijligging – Reanimatie volwassene (gehele protocol) – Reanimatie zuigeling – Aanleggen tourniquet levensbedreigend bloedverlies arm/been – Wervelletsel – Snel op de zij draaien bij braken – Verslikking zwangere/persoon met obesitas – Ernstige onderkoeling

Overige letsels

Open blaar (1) – Tand door lip (1) – Spierkramp (1) – Open botbreuk onderbeen (2) – Flauwte zonder wegraking (2)

E4

Gedurende het gehele examen

Let op gevaar – Inschakelen zorgprofessional

Levensbedreigende letsels en ziekten

Stabiele zijligging – Reanimatie volwassene (gehele protocol) – Reanimatie zuigeling – Aanleggen tourniquet levensbedreigend bloedverlies arm/been – Wervelletsel – Snel op de zij draaien bij braken – Verslikking zwangere/persoon met obesitas – Ernstige onderkoeling

Overige letsels

Reiszieke (1) – Eikenprocessierups (1) – Kinderziekten (1) – Verstuiking enkel (2) – Wrijvingsblaar (dicht) (2)

E5

Gedurende het gehele examen

Let op gevaar – Inschakelen zorgprofessional

Levensbedreigende letsels en ziekten

Stabiele zijligging – Reanimatie volwassene (gehele protocol) – Reanimatie zuigeling – Aanleggen tourniquet levensbedreigend bloedverlies arm/been – Wervelletsel – Snel op de zij draaien bij braken – Verslikking zwangere/persoon met obesitas – Ernstige onderkoeling

Overige letsels

Splinterverwonding (1) – Spierletsel (1) – Bloedneus (1) – Gedeeltelijke verbranding huid (2) – Open botbreuk onderbeen (2)

Serie F

F1

Gedurende het gehele examen

Let op gevaar – Inschakelen zorgprofessional

Levensbedreigende letsels en ziekten

Stabiele zijligging – Reanimatie volwassene (gehele protocol) – Reanimatie zuigeling – Opstoppen wond in verband met levensbedreigende bloeding oksel – Wervelletsel – Rautekgreep vanaf een stoel – Verslikking – Beroerte

Overige letsels

Oppervlakkige verbranding huid (1) – Tekenbeet (1) – Ontwrichting schouder (1) – Bijtende stof in oog (2) – Flauwte zonder wegraking (2)

F2

Gedurende het gehele examen

Let op gevaar – Inschakelen zorgprofessional

Levensbedreigende letsels en ziekten

Stabiele zijligging – Reanimatie volwassene (gehele protocol) – Reanimatie zuigeling – Opstoppen wond in verband met levensbedreigende bloeding oksel – Wervelletsel – Rautekgreep vanaf een stoel – Verslikking – Beroerte

Overige letsels

Onderkoeling (1) – Zeedierensteek (1) – Rugpijn (1) – Volledige verbranding huid (2) – Open botbreuk onderarm (2)

F3

Gedurende het gehele examen

Let op gevaar – Inschakelen zorgprofessional

Levensbedreigende letsels en ziekten

Stabiele zijligging – Reanimatie volwassene (gehele protocol) – Reanimatie zuigeling – Opstoppen wond in verband met levensbedreigende bloeding oksel – Wervelletsel – Rautekgreep vanaf een stoel – Verslikking – Beroerte

Overige letsels

Kleine snijwond (1) – Oorpijn (1) – Ontwrichting schouder (1) – Vergiftiging via de huid (2) – Oververhitting (2)

F4

Gedurende het gehele examen

Let op gevaar – Inschakelen zorgprofessional

Levensbedreigende letsels en ziekten

Stabiele zijligging – Reanimatie volwassene (gehele protocol) – Reanimatie zuigeling – Opstoppen wond in verband met levensbedreigende bloeding oksel – Wervelletsel – Rautekgreep vanaf een stoel – Verslikking – Beroerte

Overige letsels

Schaafwond (1) – Voorwerp in neus (1) – Insectenbeet/-steekr (1) – Verstuiking enkel (2) – Chemische brandwond (2)

F5**Gedurende het gehele examen**

Let op gevaar – Inschakelen zorgprofessional

Levensbedreigende letsels en ziekten

Stabiele zijligging – Reanimatie volwassene (gehele protocol) – Reanimatie zuigeling – Opstoppen wond in verband met levensbedreigende bloeding oksel – Wervelletsel – Rautekgreep vanaf een stoel – Verslikking – Beroerte

Overige letsels

Open blaar (1) – Onderkoeling (1) – Vuiltje in het oog (1) – Gedeeltelijke verbranding huid (2) – Snijwond pols (zwachtelen) (2)